

2300
716/743

e 0,21

Datum proizvodnje /
Najbolje upotrijebiti do:
otisnuto na poklopcu.



Važna napomena:

HiPP ORS 200 je gotovi napitak za rehidraciju, proizveden od prirodnih sastojaka s nutritivnim sastavom koji je posebno pripremljen za regulaciju poremećaja u ravnoteži vode i elektrolita.

Način primjene i doziranje: od 5. mjeseca pod nadzorom liječnika; ako se upotrebljava prije, onda samo prema preporuci liječnika. Ako nije drukčije preporučio liječnik, u prvih 3 do 4 sata isključivo ORS 200.

Minimalna dehidracija: 20 do 30 ml/kg tjelesne težine (TT) (gubitak na težini do 3% od TT). Laka do umjerena dehidracija: 30 do 80 ml/kg TT (gubitak na težini od 3 do 8% od TT)

Nakon uspješne rehidracije, odmah je moguće početi s normalnom prehranom (vidite informaciju na poleđini etikete). Daljnji gubitak tekućine koji je uzrokovan povraćanjem i /ili proljevom nadoknadi se dodatnim 50-100 ml ORS 200 nakon svakog perioda vodene stolice/povraćanja (najbolje davati ORS 200 na žlicu i u kratkim intervalima, npr. svakih 5 do 10 minuta).



Kontraindikacije: akutno i kronično zatajenje bubrega, metabolične alkaloze, nekontrolirano povraćanje, dezorientiranost/šok, poremećaji resorpcije ugljikohidrata, okluzije crijeva. Nije prikladno za korištenje u slučaju alergije ili netolerancije na bilo koji sastojak proizvoda.

OD
5.
MJESECA

Ako se upotrebljava
prije, onda samo prema
preporuci liječnika

HiPP

ORS 200

GOTOVI NAPITAK OD MRKVE

rižine sluzi i elektrolita

- rehidracijska otopina kod dehidracije uzrokovane proljevom i povraćanjem
- gotovi napitak • bez glutena • od 5. mjeseca za dojenčad i djecu

Hrana za
posebne
medicinske
potrebe

Namjena proizvoda: za dijetalnu prehranu bolesnika kod dehidracije uzrokovane proljevom i povraćanjem
Sastojci: voda, mrkva (26%), riza (2%), glukozni sirup, jodirana kuhinjska sol, natrijev citrat (95 mg/100 ml), kalijev citrat (66 mg/100 ml), regulator kiselosti: limunska kiselina.

Hranjive vrijednosti

	u 100 ml	u bočici
Energetska vrijednost kJ/kcal	88/21	176/42
Masti	0,1 g	0,2 g
(od kojih: zasićene masne kiseline)	(0,01 g)	(0,02 g)
Ugljikohidrati	4,2 g	8,4 g
(od kojih: šećeri)	(2,5 g)	(5 g)
Bjelančevine	0,3 g	0,6 g
Sol	0,3 g	0,6 g
Natrij	0,12 g	0,24 g
Kalij	98 mg	196 mg

Osmolarnost: 240 mOsmol/l

Čuvati na sobnoj temperaturi. Protresti prije upotrebe. ORS 200 upotrebljavati rashlađen. Ostatak pokriti, čuvati u hladnjaku i upotrijebiti unutar 24 sata.

Ako se poklopac pod pritiskom udubljuje, molimo ne koristiti. Vakumirano; kod prvog otvaranja poklopac klknite. Ovaj proizvod zadovoljava sve uvjete kvalitete - prije upotrebe obavezno provjeriti da je staklenka neoštećena.

Zemlja podrijetla: Mađarska. Stavlja na tržište HiPP Croatia d.o.o., Ul. kralja Zvonimira 1, 44400 Gline, Hrvatska; Marketing i prodaja: XII Podbrežje 26, 10020 Zagreb, Hrvatska, tel. 01/6593-796; HiPP savjetovalište za roditelje: 01/6593-796; www.hipp.hr; Besplatni telefon: 0800 31 31 33.

HiPP ORS 200

gotovi napitak od mrkve, rižine sluzi i elektrolita
dijjetetska hrana za oralnu upotrebu

Art. no. 2300

HiPP ORS 200, gotovi napitak od mrkve i rižine sluzi.
Dijjetetska hrana za oralnu upotrebu od vode, mrkve, rižine sluzi i mineralnih tvari. Upotreba ovisi o stupnju dehidracije djeteta. Proizvod se mora uzimati pod liječničkim nadzorom. Proizvod nije primjerен kao jedini izvor prehrane.

Oporavak nakon rehidracije

Rehidracija:

Minimalna do umjerena dehidracija (umjereni gustak vode): 20 do 30 ml ORS 200 / kg tjelesne težine (TT) za minimalnu dehidraciju i 30 do 80 ml / kg TT za laku do umjerenu dehidraciju tijekom prva 3 do 4 sata (rehidracija).

Teška dehidracija: Nužno je posavjetovati se sa svojim liječnikom. ORS 200 se može također upotrebljavati i uz eventualnu parenteralnu rehidraciju.

Oporavak:

Dojenčad koja su na majčinom mlijeku, trebaju i dalje nastaviti s dojenjem (majčinim mlijekom) paralelno kako se i upotrebljava ORS 200 - između dojenja je ORS 200 preporučljiv u malim odvojenim količinama.

Dojenčadi koja nisu dojena u prvoj polovici godine života daje se uobičajen mlijecni obrok nakon faze rehidracije.

Dojenčadi koja je već na prijelaznoj hrani daje se cijela količina i koncentracija prijelazne hrane i mlijeka koje inače primaju. U slučajevima jakog oblika bolesti – postepeni oporavak.

Starijoj djeci se u početku daje lagana hrana i čajevi. Napitci s visokim sadržajem šećera (saharosa, fruktoza, sorbitol) trebaju se izbjegavati. Nakon dva, ali ne kasnije od pet dana, treba se uvesti prilagođena prehrana.