



e 0,21

Datum proizvodnje /
Najbolje upotrijebiti do:
otisnuto na poklopcu.
9062300126188

**Važna napomena:**

HiPP ORS 200 je gotovi napitak za rehidraciju, proizведен od prirodnih sastojaka s nutritivnim sastavom koji je posebno pripremljen za regulaciju poremećaja u ravnoteži vode i elektrolita.

Način primjene i doziranje: od 5. mjeseca pod nadzorom liječnika. Ako nije drukčije preporučio liječnik, u prvih 3 do 4 sata isključivo ORS 200. Minimalna dehidracija: 20 do 30 ml/kg tjelesne težine (TT) (gubitak na težini do 3% od TT). Laka do umjerena dehidracija: 30 do 80 ml/kg TT (gubitak na težini od 3 do 8% od TT)

Nakon uspješne rehidracije, odmah je moguće početi s normalnom prehranom (vidite informaciju na poledini etikete). Daljnji gubitak tekućine koji je uzrokovan povraćanjem i/ili proljevom nadoknadi se dodatnim 50-100 ml ORS 200 nakon svakog perioda vodene stolice/povraćanja (najbolje davati ORS 200 na žlicu i u kratkim intervalima, npr. svakih 5 do 10 minuta).



Kontraindikacije: akutno i kronično zatajenje bubreža, metabolicne alkaloze, nekontrolirano povraćanje, dezorientiranost/šok, poremećaji resorpkcije ugljikohidrata, okluzije crijeva. Nije prikladno za korištenje u slučaju alergije ili netolerancije na bilo koji sastojak proizvoda. Nije za parenteralnu namjenu.

OD
5.
MJESECA

HiPP

Hrana za posebne medicinske potrebe

ORS 200

GOTOVI NAPITAK OD JABUKE i elektrolita

- rehidracijska otopina kod dehidracije uzrokovane proljevom i povraćanjem
- gotovi napitak • bez glutena • od 5. mjeseca za dojenčad i djecu

Namjena proizvoda: za dijetalnu prehranu bolesnika kod dehidracije uzrokovane proljevom i povraćanjem

Sastojci: voda 83%, sok od jabuke 16%, maltodekstrin, jodirana kuhinjska sol, kalijev citrat, regulator kiselosti: limunska kiselina.

Prosječne hranjive vrijednosti	u 100 ml	u bočici
Energetska vrijednost kJ/kcal	53/12	106/25
Masti	0,06 g	0,12 g
(od kojih: zasićene masne kiseline)	(0,0 g)	(0,0 g)
Ugljikohidrati	3,0 g	6,0 g
(od kojih: šećeri)	(1,6 g)	(3,2 g)
Bjelančevine	0,02 g	0,04 g
Sol	0,35 g	0,7 g
Natrij	0,14 g	0,28 g
Kalij	80 mg	160 mg

Osmolarnost: 240 mOsmol/l.

Čuvati na sobnoj temperaturi. Protresti prije upotrebe. ORS 200 upotrebljavati rashlađen. Ostatak pokriti, čuvati u hladnjaku i upotrijebiti unutar 24 sata.

Ako se poklopac pod pritiskom udubljuje, molimo ne koristiti. Vakumirano; kod prvog otvaranja poklopac klikne.

Ovaj proizvod zadovoljava sve uvjete kvalitete – prije upotrebe obavezno provjjeriti je li staklenka neostrećena. Proizvođač: HiPP Termelő és Kereskedelmi Kft., Hanságliget, Hipp u. 1, UP 9116 Bösárkány, Mađarska; Stavlja na tržište: HiPP Croatia d.o.o., Ul. kralja Zvonimira 1, 44400 Glini, Hrvatska; Marketing i prodaja: XIII Podbrežje 26, 10020 Zagreb, Hrvatska; HiPP savjetovalište za roditelje: 01/6593-796; Besplatni telefon: 0800 31 31 33; www.hipp.hr.

Molimo obratite pozornost na informacije na unutrašnjosti etikete.

HiPP ORS 200

gotovi napitak od jabuke i elektrolita
dijetetska hrana za oralnu upotrebu

Art. no. HR2303

HiPP ORS 200, gotovi napitak od jabuke. Dijetetska hrana za oralnu upotrebu od vode, jabuke i mineralnih tvari. Upotreba ovisi o stupnju dehidracije djeteta. Proizvod se mora uzimati pod liječničkim nadzorom. Proizvod nije primjereno kao jedini izvor prehrane.

Oporavak nakon rehidracije

Rehidracija:

Minimalna do umjerena dehidracija (umjereni gubitak vode): 20 do 30 ml ORS 200 / kg tjelesne težine (TT) za minimalnu dehidraciju i 30 do 80 ml / kg TT za laku do umjerenu dehidraciju tijekom prva 3 do 4 sata (rehidracija).

Teška dehidracija: Nužno je posavjetovati se sa svojim liječnikom. ORS 200 se može također upotrebljavati i uz eventualnu parenteralnu rehidraciju.

Oporavak:

Dojenčad koja su na majčinom mlijeku, trebaju i dalje nastaviti s dojenjem (majčinim mlijekom) paralelno kako se i upotrebljava ORS 200 - između dojenja je ORS 200 preporučljiv u malim odvojenim količinama.

Dojenčadi koja nisu dojena u prvoj polovici godine života daje se uobičajen mlijecni obrok nakon faze rehidracije.

Dojenčadi koja je već na prijelaznoj hrani daje se cijela količina i koncentracija prijelazne hrane i mlijeka koje inače primaju. U slučajevima jakog oblika bolesti – postepeni oporavak.

Starijoj djeci se u početku daje lagana hrana i čajevi. Napitci s visokim sadržajem šećera (saharosa, fruktoza, sorbitol) trebaju se izbjegavati. Nakon dva, ali ne kasnije od pet dana, treba se uvesti prilagođena prehrana.